

## L04AA06 - KYSELINA MYKOFENOLOVÁ

0027436 - CELLCEPT 250MG CPS DUR 100  
0027437 - CELLCEPT 500MG TBL FLM 50  
0167865 - MYCLAUSEN 500MG TBL FLM 50  
0168656 - MYCLAUSEN 250MG CPS DUR 100  
0100973 - MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250MG CPS DUR 100  
0123265 - MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500MG TBL FLM 50  
0123269 - MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500MG TBL FLM 50  
0205854 - MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 180MG TBL ENT 120  
0205858 - MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 360MG TBL ENT 120  
0242295 - MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 180MG TBL ENT 120  
0242299 - MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 360MG TBL ENT 120  
0029714 - MYFENAX 250MG CPS DUR 100  
0029716 - MYFENAX 500MG TBL FLM 50  
0018698 - MYFORTIC 360MG TBL ENT 120  
0018964 - MYFORTIC 180MG TBL ENT 120

1. základní úhrada

Změna indikačního omezení:

Mykofenolát mofetil je hrazen jako součást kombinované imunosupresivní terapie v indikacích:

- 1) profylaxe rejekce štěpu hostitelem u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, jater nebo transplantace srdce,
- 2) profylaxe reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kde není dostačující užití cyklosporinu A, a léčba GvHD neodpovídající na jiná imunosupresiva,
- 3) ANCA asociované vaskulitidy, systémový lupus erythematodes a lupusová nefritida: a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována,
- 4) sarkoidóza - ve druhé linii léčby jako kortikosteroidy šetřící agens, pokud nelze doporučit z důvodu intolerance, kontraindikace či selhání léčby methotrexát, azathioprin nebo leflunomid,
- 5) exogenní alergická alveolitida - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem,
- 6) idiopatická nespecifická intersticiální pneumonie a intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem,
- 7) intersticiální plicní postižení jako součást systémových onemocnění pojiva - zdůvodnění volby mykofenolátu jako jediné vhodné alternativy pro pacienta zvolené na základě posouzení multidisciplinárním týmem (minimálně pneumolog a revmatolog) musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta.

Plné znění indikačního omezení je možno též nalézt na stránkách [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz).

Stav k 1.2.2022.

Porovnání:

Mykofenolát ~~sedný~~ **mofetil** je hrazen jako součást kombinované imunosupresivní terapie v ~~indikaci~~ **indikacích: 1) profylaxe rejekce štěpu hostitelem pouze u dospělých pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, ledvin, jater nebo transplantace srdce, 2) profylaxe reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kde není dostačující užití cyklosporinu A, a léčba GvHD neodpovídající na jiná imunosupresiva, 3) ANCA asociované vaskulitidy, systémový lupus erythematodes a lupusová nefritida: a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, 4) sarkoidóza - ve druhé linii léčby jako kortikosteroidy šetřící agens, pokud nelze**

doporučit z důvodu intolerance, kontraindikace či selhání léčby methotrexát, azathioprin nebo leflunomid, 5) exogenní alergická alveolitida - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 6) idiopatická nespecifická intersticiální pneumonie a intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 7) intersticiální plicní postižení jako součást systémových onemocnění pojiva - zdůvodnění volby mykofenolátu jako jediné vhodné alternativy pro pacienta zvolené na základě posouzení multidisciplinárním týmem (minimálně pneumolog a revmatolog) musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta.