

0219028 - CABOMETYX 40MG TBL FLM 30

1. základní, **centrový LP**, LIM = S, MAX = 100 118,82 Kč.

Použití (za 90 dní zpětně): ZULP 14 ks, RP 0 ks

Změna indikačního omezení:

Kabozantinib je hrazen: 1) v první linii léčby pokročilého světlobuněčného karcinomu ledviny se střední/špatnou prognózou (s prognostickým skóre dle IMDC o hodnotě 1-6) u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. 2) ve druhé linii terapie pokročilého světlobuněčného karcinomu ledvin (RCC) u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0 - 1 dle ECOG, kteří už absolvovali terapii tyrozinkinázovým inhibítorem a kteří nevykazují přítomnost symptomatických mozkových metastáz anebo jsou jejich mozkové metastázy adekvátně léčené (stabilní a asymptomatické). **3) v kombinaci s nivolumabem v první linii léčby u dospělých pacientů s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem s příznivou prognózou (dle kritérií IMDC) ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, u kterých je s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a prognostická kritéria vhodné použití kombinačního režimu s imunoterapií.** Léčba je ve všech indikacích hrazena do progresu onemocnění podle platných doporučení RECIST.

Plné znění indikačního omezení je možno též nalézt na stránkách www.sukl.cz.

Stav k 1.1.2026.

Porovnání s původním zněním:

Kabozantinib je hrazen: 1) v první linii léčby pokročilého ~~světlobuněčného~~ **světlobuněčného** karcinomu ledviny se střední/špatnou prognózou (s prognostickým skóre dle IMDC o hodnotě 1-6) u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. 2) ve druhé linii terapie pokročilého ~~světlobuněčného~~ **světlobuněčného** karcinomu ledvin (RCC) u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0 - 1 dle ECOG, kteří už absolvovali terapii tyrozinkinázovým inhibítorem a kteří nevykazují přítomnost symptomatických mozkových metastáz anebo jsou jejich mozkové metastázy adekvátně léčené (stabilní a asymptomatické). **3) v kombinaci s nivolumabem v první linii léčby u dospělých pacientů s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem s příznivou prognózou (dle kritérií IMDC) ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, u kterých je s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a prognostická kritéria vhodné použití kombinačního režimu s imunoterapií.** Léčba je ~~ve všech~~ **ve všech** indikacích hrazena do progresu onemocnění podle platných doporučení RECIST.